

Kindergeneeskunde **seks** en gender

kinderen < 12 jaar

■ meisjes ■ jongens



Enuresis nocturna
8% meisjes en 12% jongens
m/j ratio 2:3
Prevalentie Turkse of Marokkaanse kinderen 2 keer zo hoog

Fecale incontinentie
Vaker bij jongens



Obstipatie als oorzaak bij fecale incontinentie
Oorzaak fecale incontinentie bij jongens 4 maal vaker door obstipatie dan bij meisjes



Zorggebruik
0-4 jaar
Zorgkosten hoger voor jongetjes, met name eczeem, astma en SEH letsels



bewegingsapparaat

Vaker bij jongens

Ziekte van Sever
m/j ratio 1:3

Ziekte van Perthes
m/j ratio 1:3

Coxitis fugax
m/j ratio 1:2

Vaker bij meisjes

Heupdysplasie (aangeboren):
m/j ratio 4:1

Osgood- Schlatter
bij meisjes tussen de 8-12 jaar
bij jongens tussen 12-15 jaar

jongeren 12-18 jaar

■ meisjes ■ jongens



59% | 74%
voelt zich mentaal gezond



13% | 6%
voelt zich eenzaam



59% | 30%
voelt zich vaak gestresst



Angststoornis
m/j ratio 3:1

Depressie
m/j ratio 2:1



Fietsongelukken
m/j ratio 2:3



Alcoholintoxicatie
m/j ratio 1:2



31% | 16%
voelt zichzelf te zwaar



12% | 39%
gamet dagelijks



Luister naar de vlog van Patricia van Wijngaarden-Cremers over **ADHD**

Seksueel misbruik

meisjes

jongens

begin vaak jonger dan 10 jaar

begin vaker rondom 10 jaar

plegers vaak oudere jongens en mannen binnen het gezin

plegers vaak oudere jongens en mannen buiten het gezin

meestal enkele malen per week

meestal onregelmatiger en minder frequent

vaginaal en oraal

anaal en oraal

gevolgen agressief gedrag vaker gericht naar binnen (gewelddadig naar zichzelf, automutilatie)

gevolgen agressief gedrag vaker gericht naar buiten (gewelddadig naar anderen, criminaliteit)

