


Urologie sekse en gender



Blaascapaciteit Vrouw heeft een kleinere blaas dan de man

Mictiefrequentie per dag
– vrouwen 6,9
– mannen 6,0

Mictiefrequentie per liter vochtinname
– vrouwen 4,2 keer
– mannen 2,8 keer



M2 receptoren

Jonge vrouwen hebben minder M2 receptoren dan jonge mannen. Daarom hebben jonge mannen een krachtiger straal en plassen beter uit dan jonge vrouwen.

Oudere vrouwen hebben meer M2 receptoren dan oudere mannen. Daarom hebben oudere vrouwen een krachtiger straal en plassen beter uit dan oudere mannen.



Anatomie

Vrouwen hebben alleen een externe sfincter: minder krachtige afsluiting dan bij mannen.

Mannen hebben een interne én externe sfincter: krachtiger afsluiting dan bij vrouwen.



Prevalentie urineincontinentie bij vrouwen hoger ratio v/m 3:1



Prevalentie urineweg-infecties bij vrouwen hoger ratio v/m 6:1



OBS



vrouwen ervaren vaker klachten van OBS
vrouwen ervaren OBS-klachten vaker ernstiger dan mannen
vrouwen ervaren psychosociaal meer hinder van OBS dan mannen

Blaascarcinoom

blaascarcinoom komt 3 maal vaker voor bij mannen dan bij vrouwen



Stadium bij diagnose

Vrouwen vaker dan mannen vergevorderd stadium door doktersdelay

Vrouwen 2.5 maal vaker dan mannen consult bij huisarts alvorens verwijzing uroloog



Vrouwen hebben een slechtere overlevingskans bij blaascarcinoom dan mannen



5-jaarsoverleving

vrouwen 67%
mannen 76%



Risicofactoren

Androgenen (blokkeren tumor-killing cells)



Meer mannen dan vrouwen roken



Luister naar de vlog van Doreth Teunissen over huisarts-geneeskunde




geslachtschromosomen
geslachtshormonen

sekse

ziekte pathofysiologie symptomen respons op behandeling

epigenetische effecten



gedrag van patiënten en artsen

MAATSCHAPPIJ

leefstijl
voedingsgewoontes
beweging
ervaren stress
roken

gender

ziektebeleving
hulpvraaggedrag
zorggebruik
besluitvorming

